



مکان یابی QTL‌های عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین‌های خالص حاصل از تلاقی ارقام روشن و

فلات گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کم آبی

مریم درانی نژاد^۱، قاسم محمدی نژاد^{*}^۲، بابک ناخدا^۳

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان.

^۲دانشیار اصلاح نباتات، قطب علمی تنش‌های محیطی در غلات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

^۳استادیار اصلاح نباتات، بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۴/۲۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

چکیده

با هدف شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گندم نان در شرایط کم آبی با استفاده از روش مکان یابی فاصله‌ای مرکب جامع (ICIM)، ۳۰۵ لاین خالص نسل F₈ گندم حاصل از تلاقی ارقام روشن و فلات به همراه چهار شاهد روشن، فلات، مهدوی و شاه پسند در قالب طرح آگمنت بررسی شدند. به منظور اعمال تنش، آبیاری در مرحله سنبله‌دهی قطع گردید و عملکرد دانه به همراه برخی صفات زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین لاین‌های مورد مطالعه از نظر تمامی صفات موردنظر تفرق قابل توجهی وجود دارد. نقشه ژنتیکی با استفاده از ۸۰۸ نشانگر دارت ایجاد شد. طول نقشه ۵۳۹۵/۶۹ سانتی‌مترگان با متوسط فاصله ۷ سانتی‌مترگان بین نشانگرهای مجاور بود. در مجموع تعداد ۲۴ QTL روی ۱۳ کروموزوم مختلف برای ۱۲ صفت با اثر افزایشی مکان یابی شد. چهار QTL، ضریب تبیین بالای ۱۰ درصد داشتند. مکان ژنی qAL6A به عنوان یک QTL بزرگ‌اثر برای صفت طول ریشک شناسایی شد که به تنهایی ۲۶/۲۴ درصد از تنوع فنوتیپی این صفت را توجیه کرد. ۱۷/۱۵ درصد از واریانس فنوتیپی صفت طول پدانکل توسط qPL4B توجیه شد. این QTL با یکی از QTL‌های کنترل‌کننده صفت طول غلاف برگ پرچم در موقعیت کروموزومی تقریباً یکسان قرار داشت، این امر می‌تواند ناشی از اثر پلیوتروپی یا به دلیل پیوستگی ژن‌های کنترل‌کننده دو صفت باشد. نواحی ژنومی بزرگ‌اثر مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه در شرایط کم آبی پس از تعیین اعتبار می‌توانند در برنامه‌های اصلاحی و انتخاب به کمک نشانگر برای ایجاد ارقام پر عملکرد و متحمل مورد استفاده قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: تنش رطوبتی، گندم نان، QTL.

مقدمه

آزمایش که در دو شهر کرمان و یزد انجام شد QTL هایی برای صفت تعداد دانه در سنبله واقع بر کروموزوم های ۱A، ۱B، ۱D، ۲A، ۲B، ۳A، ۳B، ۴A، ۴B، ۵B، ۶A، ۶B و ۷A، برای وزن هزاردانه روی کروموزوم های ۲B، ۲D، ۳B، ۴A، ۵A و ۷D، برای صفت طول سنبله روی کروموزوم های ۴B و ۷A و برای عملکرد بیولوژیک دو QTL روی کروموزوم ۲D گزارش شد (Azadi *et al.*, 2014). در پژوهشی با هدف نقشه یابی QTL های کترل کننده صفات مورفو لولوژیکی در گندم سه QTL برای صفت ارتفاع بوته واقع بر کروموزوم های ۲B، ۴B و ۴D شناسایی شد که ۴۱ درصد از واریانس فنتیپی ارتفاع بوته را توجیه می کردند. سه QTL هم در همین مکان های ژنی برای صفت طول پدانکل گزارش شد که ۲۴/۱ درصد از تنوع فنتیپی طول پدانکل را توجیه کردند. همچنین در این پژوهش دو QTL برای صفت طول سنبله روی کروموزوم های ۲D و ۶B مکان یابی شد که ۱۶/۸ درصد از تغییرات این صفت را توجیه می نمود (Mohammadi *et al.*, 2005). در پژوهشی دیگر هفت QTL بزرگ اثر مرتبط با وزن هزاردانه واقع بر کروموزوم های ۱B، ۲A، ۲D، ۶A و ۷A مکان یابی شد (Wei *et al.*, 2014). نتایج بررسی های مولکولی برای یافتن ژن های کترل کننده صفات مهم زراعی در گندم، تعدادی QTL کترل کننده صفت ارتفاع بوته را روی کروموزوم ۳A نشان داد (Shah *et al.*, 1999).

طی یک گندم یکی از مهم ترین محصولات غذایی است که ۴۰ درصد از انرژی و غذای موردنیاز مردم جهان را تأمین می کند. با افزایش جمعیت جهان تقاضای جهانی برای گندم قبل از سال ۲۰۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت (Wei *et al.*, 2014). خشکی یکی از موانع جدی برای تولید محصولات کشاورزی در جهان است (Mir *et al.*, 2012). بیش از ۴۵ درصد از زمین های کشاورزی در مناطق خشک قرار گرفته است (Ashraf & Foolad, 2007) جوی در سال های اخیر و افزایش تقاضا برای گندم، تولید ارقامی از گندم با پتانسیل عملکرد بالا و متحمل به خشکی را ضروری می نماید. استفاده از برنامه های بهتر از گندم برای بهبود ژنتیکی تحمل به خشکی بر اساس عملکرد و پایداری آن در سال ها و مکان های متفاوت وقت گیر می باشد لذا گزینش را براساس سایر صفات انجام داده (Manickavelu *et al.*, 2006). بدین منظور نیازمند اطلاعاتی در خصوص محل و اثر مکان های ژنی کترل کننده این صفات بوده تا بتوان با دست کاری آنها، صفت مورد نظر را بهبود بخشید. جهت شناسایی این صفات می توان از روش گزینش به وسیله نشانگر استفاده کرد (Cattivelli *et al.*, 2008). استفاده از نشانگرهای مولکولی پیوسته با صفات کمی و کیفی مرتبط با عملکرد در سال های اخیر کمک شایانی به متخصصان اصلاح نبات نموده است. در یک

روشن و فلاٹ گندم نان انجام شد. لاین‌ها به همراه چهار شاهد روشن، فلاٹ، مهدوی و شاه-پسند در قالب طرح آگمنت با ۱۷ بلوک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۱۳۹۲-۹۳ کشت شدند. این منطقه دارای طول جغرافیایی ۵۷ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه بوده و در ارتفاع ۱۷۵۶ متری از سطح دریا قرار دارد. بافت خاک آن از نوع لومی شنی با اسیدیته ۷/۹ و هدایت الکتریکی ۲/۱۱ دسی زیمنس بر متر می‌باشد. مراقبت‌های لازم در طول دوره رشد مانند کوددهی، وجین علف‌های هرز با دست صورت گرفت. به منظور اعمال تنش قطع آبیاری در مرحله سنبله‌دهی صورت گرفت. صفات طول دوره پرشدن دانه، وزن دانه‌های سنبله اصلی، تعداد دانه‌های سنبله اصلی، وزن دانه‌های تک بوته، تعداد دانه‌های تک بوته، وزن کاه، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در بوته، وزن سنبله اصلی، تعداد گره، ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، طول غلاف برگ پرچم، طول پدانکل، طول سنبله، طول ریشک، وزن تک بوته، عملکرد بیولوژیک و اقتصادی در واحد سطح و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تهیه نقشه ژنتیکی برای این جمعیت، از اطلاعات مولکولی ۸۵۸ نشانگر دارت استفاده شد که ۸۰۸ نشانگر پلی مورفیسم بین والدین نشان دادند. تهیه نقشه و تجزیه QTL با استفاده از نرم‌افزار ICIM (Inclusive composite interval mapping) و بر اساس مکانیابی

بررسی در گندم نان QTL‌هایی برای ارتفاع بوته روی کروموزوم‌های ۲A و ۲B و برای وزن دانه روی کروموزوم‌های ۱A، ۲B و ۷A شناسایی شد (Gupta *et al.*, 2007). نتایج یک مطالعه در گندم نان مکان‌های ژنی کنترل‌کننده صفت تعداد دانه در سنبله را روی کروموزوم‌های ۲D و ۴A و ۴A، ۲D و ۶A نشان داد (Borner *et al.*, 2002). با توجه به اهمیت گندم در تغذیه بشر و کاهش تولید آن به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر، تولید ارقامی از گندم با پتانسیل عملکرد بالا و متحمل به خشکی دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. از آنجایی که عملکرد یک صفت کمی است و به دلیل پلی‌ژن بودن از وراثت‌پذیری پایینی برخوردار می‌باشد، مطلوب است جهت بهبود عملکرد، گزینش از طریق سایر صفات انجام گیرد. بنابراین شناسایی ژن‌های کنترل‌کننده عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد در شرایط کم‌آبی به منظور اصلاح ژنتیکی گندم مهم می‌باشد. در این راستا، این مطالعه با هدف مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کننده عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط کم‌آبی در یک جمعیت لاین خالص حاصل از تلاقی گندم رقم روشن با رقم فلاٹ انجام شد.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر به منظور شناسایی مکان‌های ژنی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در ۳۰۵ لاین خالص نسل F₈ حاصل از تلاقی ارقام

های ۱B، ۲A، ۵A، ۵B، ۲D و ۷A با یک QTL مکانیابی شدند. برای نیمی از صفات مورد مطالعه، بیش از یک QTL شناسایی شد که نشان-دهنده ماهیت چندزنی بودن این صفات است (جدول ۲). بیشترین QTL های کنترل کننده صفات مورد مطالعه در این جمعیت بر روی ژنوم B مکانیابی شدند که می تواند با شرایط موجود نشان دهنده نقش بالای این ژنوم در شرایط کم آبی باشد.

QTL های طول ریشک: برای صفت طول ریشک سه QTL شناسایی شد. qAL6A به عنوان یک QTL بزرگ اثر با $LOD = 18/96$ به تنها ۲۶/۲۴ درصد از واریانس این صفت را توجیه کرد. این QTL دارای اثر افزایشی ۱/۴- می باشد که در فاصله ۲۲۶/۵ سانتی مترگان از ابتدای کروموزوم قرار دارد و از آنجایی که والد روشن بدون ریشک می باشد، لذا اثر کاهنده این QTL مربوط به الهای والد روشن می باشد. qAL1D و qAL3B با $LOD = 2/5$ به ترتیب ۳/۸ و ۴/۲ درصد از تغییرات فنتوپی این صفت را توجیه کردند. این دو QTL به ترتیب با اثر افزایشی ۰/۶۴ و ۰/۵۹ در فاصله ۴۲/۵ و ۴۳۱/۵ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارند. اثر افزاینده این دو QTL، مربوط به الهای والد فلات می باشد. حدود ۳۴/۲۴ درصد از تغییرات فنتوپی این صفت در جمعیت مورد مطالعه ناشی از اثر الهای این سه QTL می باشد.

فاصله ای مرکب جامع انجام شد. آستانه LOD برای شناسایی QTL ها ۲/۵ در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد دو والد صرفا از نظر سه صفت وزن کاه، ارتفاع بوته و طول ریشک اختلاف معنی دار داشتند، اما بین لاین های مورد مطالعه از نظر تمامی صفات مورد نظر تفرق قابل توجهی دیده شد (جدول ۱)، دلیل این امر می تواند پخشیدگی ژنی باشد، بدین معنی که در هر یک از والدین، ترکیب مکان های ژنی با اثرات افزایشی مثبت و منفی به گونه ای است که در نهایت اثرات یکدیگر را خنثی و در حد معین ثابت نگه می دارند. در اثر تفرق این مکان های ژنی و به وجود آمدن ترکیبات جدیدتر، تفرق فرارونده و توزیع صفت اتفاق می افتد و در نهایت احتمال مکانیابی QTL بالا می رود (Fotokian *et al.*, 2010). نقشه ژنتیکی این جمعیت با استفاده از ۸۰۸ نشانگر DArT ایجاد شد که ۵۳۹۵/۶۹ سانتی مورگان از ژنوم را پوشش داد، به طور متوسط هر ۷ سانتی مورگان یک نشانگر استفاده شد. در مجموع تعداد ۲۴ QTL واقع بر ۱۳ کروموزوم مختلف برای ۱۲ صفت مکانیابی شد. همه QTL های شناسایی شده اثر افزایشی داشتند، حدود ۳۳ درصدشان با اثر افزایشی منفی بودند. از QTL های شناسایی شده، چهار QTL، ضریب تبیین بالای ۱۰ درصد داشتند. حداکثر تعداد QTL در کروموزوم ۴B با چهار QTL و حداقل تعداد QTL در کروموزوم -

درانی نژاد و همکاران، ۱۳۹۵

جدول ۱- میانگین والدین و بیشینه و کمینه جمعیت برای صفات مورد مطالعه.

Table 1- Mean of parents and max and min of population for under studied traits.

میزان LSD	ضریب پراکنده‌گی coefficient of variation	کمینه جمعیت Population min	بیشینه جمعیت Population max	میانگین والدین Mean of parents		صفات Traits
				فلات Roshan	روشن Falat	
8.94	0.08	24.04	46.54	39.45	38.31	طول دوره پر شدن دانه Grain filling period
47.74	0.03	18.00	101.00	49.11	67.78	تعداد دانه‌های سنبله اصلی Grain No. of main spike
5.88	0.15	1.1	10.57	13.56	4.37	وزن کاه (تن در هکتار) Straw weight (ton/ha)
15.78	0.16	17.09	56.13	44.44	31.50	وزن هزاردانه (گرم) Thousand-grain weight (g)
29.67	0.1	71.99	169.24	136.11	89.56	ارتفاع بوته (سانتی‌متر) Plant height (cm)
11.41	0.05	14.00	34.50	21.06	23.25	طول برگ پرچم (سانتی‌متر) Flag leaf length (cm)
0.64	0.08	1.00	2.70	1.87	1.92	عرض برگ پرچم (سانتی‌متر) Flag leaf width (cm)
6.4	0.07	15.50	33.00	23.33	19.56	طول غلاف برگ پرچم (سانتی‌متر) Flag leaf sheath length (cm)
14.51	0.14	23.03	65.40	45.43	33.13	طول پدانکل (سانتی‌متر) Peduncle length
4.33	0.08	8.50	18.00	12.68	12.58	طول سنبله (سانتی‌متر) Spike length (cm)
5.85	0.52	0.00	19.00	1.00	7.82	طول ریشک (سانتی‌متر) Awn length (cm)
0.13	0.23	0.05	0.72	0.36	0.45	شاخص برداشت Harvest Index

میزان LSD : LSD محاسبه شده بر اساس تجزیه واریانس شاهدها برای مقایسه والدین و لاین‌ها.

2010). در بررسی دیگری در گندم نان نشانگرهای پیوسته به QTL برای صفت وزن هزاردانه روی کروموزوم‌های ۱A، ۱B، ۲B، ۲D، Mir ۵B، ۵D، ۶D و ۷B شناسایی شد (Drikvand *et al.*, 2015).

QTL‌های طول پدانکل: دو QTL برای طول پدانکل با مقادیر LOD به ترتیب ۹/۴ و ۲/۷ در موقعیت‌های ۷۶ و ۱۷۴/۵ سانتی‌مورگان از ابتدای کروموزوم‌های ۴B و ۶B با اثر افزایشی ۳/۷۳ و ۱/۵۷ مکان‌یابی شدند. اثر افزاینده qPL4B، مربوط به الـهای والـد روشن و اثر کاهنده qPL6B مربوط به الـهای والـد فلات می‌باشد. این دو QTL جمعاً ۲۱/۵۶ درصد از واریانس فنتیپی مربوط به این صفت را توجیه کردند. مکان ژنی qPL4B با یکی از QTL‌های صفت طول غلاف برگ پرچم در یک منطقه کروموزوم ۴B قرار دارند، قرارگیری در موقعیت کروموزومی تقریباً یکسان این دو QTL می‌تواند ناشی از پلیوتروپی باشد یا در اثر پیوستگی ژن‌های کنترل‌کننده دو صفت مورد نظر باشد. همبستگی ژنتیکی و فنتیپی بالای این دو صفت کروموزومی این دو QTL تاییدکننده یکدیگر می‌باشند. در یک مطالعه QTL‌های کنترل‌کننده طول پدانکل در گندم روی کروموزوم‌های ۲D، ۴D و ۴E گزارش شد (Heidari *et al.*, 2012).

QTL‌های طول برگ پرچم: برای این صفت چهار QTL شناسایی شد. دو عدد مستقر

سهم سایر عوامل ناشناخته محیطی و همچنین سهم سایر QTL‌های با LOD کمتر از ۲/۵ که در جدول ۲ ارائه نشده است، در تنوع فنتیپی این صفت حدود ۶۵ درصد بوده است (Fotokian *et al.*, 2010). در پژوهشی QTL‌های کنترل‌کننده صفت طول ریشک را روی کروموزوم‌های ۴A و ۶B شناسایی کردند (Sourdille *et al.*, 2002).

QTL‌های وزن هزاردانه: سه QTL برای وزن هزاردانه مکان‌یابی شد. qTGW3B با LOD=۷ ۱۳/۷۹ درصد از تنوع فنتیپی این صفت را توجیه کرد که دارای اثر افزایشی ۳/۰۵ و در فاصله ۳۹/۵ سانتی‌مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارد و منشأ آن الـهای والـد فلات می‌باشد. qTGW4B و qTGW2B با LOD بالای ۲/۵ به ترتیب ۴/۴ و ۷/۳ درصد از تغییرات فنتیپی این صفت را توجیه کردند. این دو QTL به ترتیب با اثر افزایشی ۱/۵۳ و ۱/۹۹ در فاصله ۱۰۵/۵ و ۱۲ سانتی‌مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارند. منشأ این دو QTL، الـهای والـد روشن می‌باشد از آنجایی که صفت وزن هزاردانه از اجزای اصلی عملکرد دانه می‌باشد لذا با انتخاب ژنتیپ‌های دارای وزن هزاردانه بیشتر می‌توان به ارقام با عملکرد بالا دسترسی پیدا کرد. در یک بررسی در جمعیت لاین‌های نوترکیب گندم نان ده QTL شناسایی شده برای صفت وزن هزاردانه واقع بر کروموزوم‌های ۱D، ۲B، ۲D، ۴E، ۵B و ۵D گزارش شد (Ramya *et al.*, 2012).

۹۱/۵۱ واقع بر کروموزوم ۱D تشخیص داده شد که در فاصله ۸۶/۵ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارد و تأثیر بسیار زیادی روی این صفت دارد به طوری که ۱۶/۶ درصد از تنوع فنتوپی این صفت را توجیه کرد. منشا این QTL الهای والد روشن می باشد.

QTL‌های طول سنبله: دو مکان ژنی برای طول سنبله روی کروموزوم‌های ۱B و ۳B با ۷/۱۷ LOD بالای ۲/۵ به ترتیب با ضریب تبیین ۰/۴۱ و -۰/۵۵ و ۹/۰۳ درصد، اثر افزایشی ۱B و ۳B شناسایی شدند. این دو QTL در فاصله ۲۰۳ و ۱۳۶/۵ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارند. منشاء qSPL1B و والد روشن و منشاء qSPL3B والد فلات می باشد. در یک بررسی هایی برای طول سنبله بر روی کروموزوم-*QTL* (*Borner et al.*, 2002) در مطالعه دیگر هایی برای این صفت بر روی کروموزوم‌های ۱A، ۱B، ۱D، ۲D، ۴A و ۵A مکان یابی شد (Gupta *et al.*, 2007).

QTL‌های طول غلاف برگ پرچم: ۱۳/۷۹ درصد از تنوع فنتوپی این صفت توسط دو QTL مکان یابی شده توجیه شد که به ترتیب با اثر افزایشی -۰/۶۱ و ۰/۸۴، ضریب تبیین ۵/۶۹ و ۸/۱ درصد، با فاصله ۱۳۰ و ۷۴ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم ۱D و ۴B قرار دارند. اثر کاهنده qFLSL1D مربوط به الهای والد فلات و اثر افزاینده qFLSL4B مربوط به الهای والد روشن می باشد. برای هر یک از صفات تعداد دانه‌های

بر روی کروموزوم ۲B که در فاصله ۹۸ و ۲۳۳/۵ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارند. منشاء آنها به ترتیب الهای والد روشن و الهای والد فلات می باشد. QTL سوم بر روی کروموزوم ۲D و در فاصله ۷۶/۵ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم واقع است و مربوط به والد فلات می باشد. QTL چهارم بر روی کروموزوم ۵B و در فاصله ۱۴۹/۵ سانتی مورگان از ابتدای کروموزوم قرار دارد و مربوط به والد فلات می باشد. این چهار QTL جمعاً ۱۹/۹ درصد از تغییرات فنتوپی طول برگ پرچم را توجیه کردند. در پژوهشی QTL های کنترل کننده طول برگ پرچم واقع بر کروموزوم‌های ۳B و ۵B مکان یابی شدند (Mason *et al.*, 2010).

QTL‌های ارتفاع بوته: برای صفت ارتفاع بوته سه QTL مستقر در کروموزوم‌های ۴A، ۴B و ۷A با LOD بالای ۲/۵ مکان یابی شد. این QTL ها به ترتیب دارای اثر افزایشی ۴/۳۸، ۵/۳۶ و ۳/۴۱ بودند و در مجموع ۱۹/۴۸ درصد از تنوع فنتوپی ارتفاع بوته را توجیه کردند. با توجه به اینکه والد روشن از نظر ارتفاع بلندتر از والد فلات می باشد نتیجه می گیریم اثر افزاینده این سه QTL مربوط به الهای والد روشن می باشد که باعث افزایش ارتفاع بوته شده است. در مطالعه‌ای QTL های مرتبط با ارتفاع بوته واقع بر کروموزوم‌های ۴B، ۴D، ۷A و ۷B گزارش شدند (Sourdille *et al.*, 2002).

QTL وزن کاه: برای صفت وزن کاه یک QTL بزرگ اثر با $LOD = ۱۱/۳۶$ و اثر افزایشی

شدند (Mason *et al.*, 2010). در پژوهشی دیگر QTL‌های مرتبط با دوره پرشدن دانه بر روی کروموزوم‌های ۳B، ۵A، ۶A و ۷A تشخیص داده شدند (Golabadi *et al.*, 2012). در مطالعه‌ای دیگر QTL‌های مرتبط با زمان پرشدن دانه بر روی کروموزوم‌های ۵A و ۵B مکان‌یابی شدند (Borner *et al.*, 2002).

شناسائی نواحی ژنومی بزرگ‌اثر مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی پس از تعیین اعتبار می‌تواند در برنامه‌های بهنژادی و انتخاب به کمک نشانگر برای ایجاد ارقام پرعملکرد و متتحمل مورد استفاده قرار گیرد.

سنبله اصلی، شاخص برداشت، عرض برگ پرچم و طول دوره پرشدن دانه یک QTL با مشخصات مندرج در جدول ۲ شناسایی شد. طی یک بررسی در گندم نان برای صفت تعداد دانه‌های سنبله اصلی QTL‌هایی واقع بر کروموزوم‌های ۱A، ۱B، ۲B، ۲D، ۳B، ۳D و ۷D و برای شاخص برداشت روی کروموزوم‌های ۲D، ۳B، ۴B و ۶A مکان‌یابی شد (Gupta *et al.*, 2007).

همچنین در یک بررسی دیگر QTL‌های کنترل‌کننده عرض برگ پرچم روی کروموزوم‌های ۱D، ۲B و ۷A و طول دوره پرشدن دانه روی کروموزوم‌های ۱B، ۲A و ۲D شناسایی


درانی نژاد و همکاران، ۱۳۹۵

جدول ۲- جایگاه‌های کروموزومی شناسایی شده برای صفات مختلف در شرایط کم‌آبی با استفاده از روش نقشه‌یابی

فاصله‌ای مرکب جامع ICIM

Table 2- Identified QTLS for different traits under limited irrigation condition using ICIM method.

اثر افزایشی Additive Effect	درصد واریانس Variance Percentage	LOD	موقعیت (سانتی مورگان) Position (cM)	نشانگر چپ Left Marker	نشانگر راست Right Marker	کروموزوم Chromosome	صفات Traits
1.1087	4.2	2.75	36.5	wPt-663984	wPt-664022	21	طول دوره پرشدن دانه Grain filling period
-3.6850	7.14	3.79	222.5	wPt-671760	wPt-5730	16	تعداد دانه‌های سنبله اصلی Grain No. of main spike
91.5056	16.61	11.36	86.5	rPt-4471	wPt-5503	3	وزن کاه (تن در هکتار) Straw weight (ton/ha)
1.5344	4.4	2.76	105.5	wPt-8349	wPt-4301	5	وزن هزاردانه (گرم) Thousand-grain weight (g)
-3.0510	13.79	6.99	39.5	wPt-0446	wPt-669517	8	
1.9943	7.28	2.89	12	wPt-2525	wPt-6869	11	
5.3579	7.87	4.46	68.5	wPt-731887	wPt-1708	11	ارتفاع بوته (سانتی‌متر) Plant height (cm)
4.3809	6.92	4.08	165.5	wPt-9094	wPt-4778	13	
3.4073	4.69	3.23	47	wPt-2525	wPt-0961	19	
-0.9598	7.07	3.77	98	wPt-7883	wPt-4664	5	طول برگ پرچم (سانتی‌متر) Flag leaf length (cm)
0.6778	3.54	2.64	233.5	wPt-6576	wPt-4199	5	
0.8275	4.44	3.17	76.5	wPt-733725	wPt-0071	6	
0.7854	4.85	3.52	149.5	wPt-3922	wPt-731740	14	
0.0578	5.92	2.77	39.5	wPt-7442	wPt-666658	4	عرض برگ پرچم (سانتی‌متر) Flag leaf width (cm)
-0.61	5.69	3.21	130	wPt-733835	wPt-9380	3	طول غلاف برگ پرچم (سانتی‌متر) Flag leaf sheath length (cm)
0.8412	8.1	4.97	74	wPt-1708	wPt-9067	11	
3.7310	17.15	9.41	76	wPt-1708	wPt-9067	11	طول پدانکل (سانتی‌متر) Peduncle length (cm)
-1.5740	4.41	2.72	174.5	wPt-1730	wPt-9124	17	
0.4137	6.17	4.33	203	wPt-2526	wPt-0705	2	طول سنبله (سانتی‌متر) Spike length (cm)
-0.5507	9.03	5.18	136.5	wPt-7254	wPt-743775	8	
0.6446	3.83	2.53	42.5	wPt-7437	wPt-2968	3	طول ریشک (سانتی‌متر) Awn length (cm)
0.5902	4.17	2.61	431.5	wPt-731910	wPt-6785	8	
-1.4048	26.24	18.96	226.5	wPt-5730	tPt-8252	16	شاخص برداشت Harvest Index
-0.0293	6.93	2.83	102	wPt-0446	tPt-2055	17	




شکل ۱- نقشه پیوستگی ۱۳ کروموزوم برای QTL‌های شناسایی شده برای صفات مورد ارزیابی.

(صرفاً کروموزوم‌های واجد QTL نشان داده شده‌اند).


Figure 1- Genetic linkage map of 13 chromosomes for detected quantitative trait loci (QTLs) for evaluated traits on some chromosomes. Only linkage groups with considerable QTLs are shown.

درانی نژاد و همکاران، ۱۳۹۵



ادامه شکل ۱.

Figure 1- (continued).



ادامه شکل ۱.

Figure 1- (continued).

منابع

- Ashraf M, Foolad MR (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany 59: 206–216.
- Azadi A, Mardi M, Hervan EM, Mohammadi SA, Moradi F, Tabatabaei MT, Pirseyedi SM, Ebrahimi M, Fayaz F, Kazemi M, Ashkani S, Nakhoda B, Mohammadi-Nejad G (2014). QTL mapping of yield and yield components under normal and salt-stress conditions in bread wheat (*Triticum aestivum* L.). Plant Molecular Biology Reporter 33: 102-120.
- Borner A, Schumann E, Furste A, Coster H, Leithold B, Roder M, Weber W (2002). Mapping of quantitative trait loci determining agronomic important characters in hexaploid wheat (*Triticum aestivum* L.). Theoretical and Applied Genetics 105: 921-936.
- Cattivelli L, Rizza F, Badeck FW, Mazzucotelli E, Masterangelo AM, Francia E, Mare C, Tondelli A, Stanca AM (2008). Drought tolerance improvement in crop plants: an integrated view from breeding to genomics. Field Crop Research 105: 1-14.
- Fotokian MH, Ahmadi G, Amiri oghan H, Sadatnori A, Naji AM, Mohammadi-Nejad G, Mohaddesi A, Agahi K (2010). Identification of Quantitative Trait Loci related to plant height, number of tiller and flag leaf length and width in rice (*Oryza sativa* L.) using microsatellite markers. Iranian Journal of Biology 23: 488-497.

- Golabadi M, Arzani A, Mirmohammadi Maibody SAM (2012). Mapping of loci controlling phenological traits in durum wheat under drought stress and non-stress conditions using SSR markers. Iranian Journal of Crop Sciences 13: 712-729.
- Heidari B, Saeidi G, Sayed Tabatabaei BE, Suenaga K (2012). QTLs Involved in Plant Height, Peduncle Length and Heading Date of Wheat (*Triticum aestivum* L.). Journal of Agriculture Science and Technology 14: 1093-1104.
- Manickavelu A, Nadarajan N, Ganesh SK, Gnanamalar RP, Chandra Babu R (2006). Drought tolerance in rice: morphological and molecular genetic consideration. Plant Growth Regul 50: 121-138.
- Mason R E, Mondal S, Beecher FW, Pacheco A, Jampala B, Ibrahim AM, Hays DB (2010). QTL associated with heat susceptibility index in wheat (*Triticum aestivum* L.) under short-term reproductive stage heat stress. Euphytica 174: 423-436.
- Mir R R, Zaman-Allah M, Sreenivasulu N, Trethowan R, Varshney R K (2012). Integrated genomics, physiology and breeding approaches for improving drought tolerance in crops. Theoretical and Applied Genetics 125: 625-645.
- Mir Drikvand R, Najafian G, Bihamta MR, Ebrahimi A (2015). Detection of QTLs Associated to Some Grain Traits in Bread Wheat (*Triticum aestivum* L.), Using Association Mapping. Journal of Plant Genetic Research 1: 43-54.
- Mohammadi V, Ghanadha MR, Zali AA, Yazdi-Samadi B, Byrne P (2005). Mapping QTLs for Morphological Traits in Wheat. Iranian Journal of Agriculture Science 36: 145-157.
- Gupta PK, Balyan HS, Kulwal PL, Kumar N, Kumar A, Mir RR, Muhan A, Kumar J (2007). QTL analysis for some quantitative traits in bread wheat. Journal of Zhejiang University Science B 8: 807-814.
- Ramya P, Chaubal A, Kulkarni K, Gupta L, Kadoo N, Dhaliwal HS, Chhuneja P, Lagu M, Gupta V (2010). QTL mapping of 1000-kernel weight, kernel length, and kernel width in bread wheat (*Triticum aestivum* L.). Journal of Applied Genetics 51: 421-429.
- Shah MM, Gill KS, Baenziger PS, Yen Y, Kaeppeler SM, Ariyaratne HM (1999). Molecular mapping of loci for agronomic traits on chromosome 3A of bread wheat. Crop Science 39: 1728-1732.
- Sourdille P, Cadalen T, Gay G, Gill B, Bernard M (2002). Molecular and physical mapping of genes affecting awning in wheat. Plant Breeding 121: 320-324.
- Wei L, Bai S, Li J, Hou X, Wang X, Li H, Zhang B, Chen W, Liu D, Liu B, Zhang H (2014). QTL Positioning of Thousand Wheat Grain Weight in Qaidam Basin. Open Journal of Genetics 4: 239-244.

QTL mapping of grain yield and yield components in pure lines derived from Roshan × Falat bread wheat varieties (*Triticum aestivum* L.) under limited irrigation condition

Dorrani-Nejad M.¹, Mohammadi-Nejad G.^{*2}, Nakhoda B.³

¹MS Student of Plant Breeding, Member of young researcher association, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

²Assoc. Prof. of Plant Breeding, Center of Excellence for a biotic stresses in cereal crops, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

³Assist. Prof. Department of Molecular physiology, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj, Iran.

Abstract

In order to identify QTLs associated with grain yield and yield components in Bread Wheat under limited irrigation condition using ICIM method, 305 pure lines (F_8) generation of bread wheat derived from cross between Roshan and Falat along with four standard cultivar namely Roshan, Falat, Mahdavi and Shahpasand, were evaluated based on Augmented design. Stress treatment was cut off irrigation at heading stage. Grain yield and other agronomic traits were measured as the phenotypic traits. The result revealed that there are transgressive segregations for all under studied traits. A genetic map was constructed with 808 DArTs markers which these markers covered 5395.69 CM of the genome with the average of 7CM. In total 24 QTLs were identified on 13 chromosomes with additive effect for 12 traits. Four QTLs had $R^2 > 10$. The qAL6A was identified for awn length that explained 26.24 percent of the total phenotypic variance. qPL4B was found for peduncle length and contributed 17.15 percent of phenotypic variance and is locating at the same interval with flag leaf sheath length QTL. This phenomenon could be due to polytrophic or due to linkage effect of those genes which control these two traits. Major QTLs associated with grain yield and yield components under limited irrigation condition after validation can be used in plant breeding programs and marker-assisted selection in order to produce tolerant and high performance wheat varieties.

Key words: *Bread wheat, moisture stress, QTL.*

* Corresponding Author: Mohammadi-Nejad G. Tel: 03433257510 Email: Mohammadinejad@uk.ac.ir